

EMBERNAGRA LONGICAUDA STRIKILAND, 1844; SUA OCORRÊNCIA EM MINAS
GERAIS - BRASIL
(AVES, FRINGILLIDAE)

Ney Carnevalli*

INTRODUÇÃO

O Gênero *Embernagra* (Lesson, 1831) é endêmico da América do Sul e apresenta duas espécies: a *Embernagra platensis*, registrada para o sudeste do Brasil (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul) até o este da Argentina, Paraguai, Uruguai (O. Pinto, 1944; Peters, 1970) e também para a Bolívia (Schauensee, 1970); a outra espécie é a *Embernagra longicauda* que foi registrada somente para a localidade de Morro do Chapéu, na Bahia, onde foram coletados, um holótipo e mais três espécimes (Peters, 1970; Schauensee, 1970; Gruson, 1976; Walters, 1980).

Como parte de um levantamento da ornitofauna do Estado de Minas Gerais, que a Divisão de Ornitologia do Departamento de Zoologia do ICB/UFMG, está desenvolvendo desde 1971, apresentamos na presente nota a ocorrência da *Embernagra longicauda* para Minas Gerais.

O primeiro achado desta espécie em Minas Gerais, foi em 1976 na localidade de Quebra Ossos na Serra do Caraça. Município de Santa Bárbara - MG - (CARNEVALLI, 1980). Posteriormente foi observada e identificada na Serra do Cipô, pelo autor, (1977), e durante recentes viagens (1979/1980) pelo Vale do Jequitinho-

* Prof. Assistente Divisão de Ornitologia.
Departamento de Zoologia - ICB/UFMG

nha - MG - (alto e médio) a espécie foi observada e identificada ao longo de toda a Serra do Espinhaço em Minas Gerais (da cidade de Datas até Salto da Divisa).

A descoberta da *Embernagra longicauda* em Minas Gerais aumenta grandemente sua área de distribuição, restrita até agora a localidade de Morro do Chapéu (BA - Brasil) (Fig. 1).

RESUMO

Embernagra longicauda. Strikiland, 1844, nova ocorrência em Minas Gerais - Brasil (Aves, Fringillidae).


ABSTRACT

The genus *Embernagra* Lesson 1831 with the species *E. platensis* and *E. longicauda* is endemic to South America. *E. platensis* occurs in South east Brasil ranging from the State of Minas Gerais to Rio Grande do Sul, Uruguay, east Argentina and Paraguay while *E. longicauda* was known only from its type locality, Morro do Chapéu of Bahia.

Since 1971, the Departement of Zoology of Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) started an ornithological surveying program to the State of Minas Gerais. In this survey, *E. longicauda* has recorded for 11 (eleven) new localities distributed along the mountain range of Serra do Espinhaço wich crosses the State of Minas Gerais from North/South.

BIBLIOGRAFIA

- CARNEVALLI, N. 1979 - Primeiros Estudos sobre a ornitofauna do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais - Brasil. Relatório datilografado e entregue ao CETEC - MG. Convênio CETEC/UFMG.
- CARNEVALLI, N. 1980 - Estudos sobre a ornis da área correspondente ao Parque Estadual da Serra do Cipó - Minas Gerais. Relatório datilografado e entregue ao CETEC-MG. Convênio CETEC/UFMG.
- CARNEVALLI, N. 1980 - Contribuição ao Estudo da Onitofauna da Serra do Caraça, Minas Gerais. Revista LUNDIANA nº 1. Publ. do Deptº. Zool. ICB. UFMG, pág. 88. a 98.
- CRUSOU, E.S. 1976 - Check-list of the World's Birds. Quadrangle/The New Jork Times Book Co.
- PETERS, J.L. 1970 - Check - List of Birds of the world. Ed. by Raymond A. Paynter Jr. - Cambridge - Massachusets Museum of Comparative Zoology - Vol. XIII p. 131-132.
- PINTO, O.M.O. 1944 - Catálogo de Aves do Brasil 2ª parte. Revista do Museu Paulista 1:700 - Ilustrado. Publ. do Deptº. Zool. Secret. Agric. Ind. Com. São Paulo - Brasil.
- _____. 1952 - Súmula Histórica e Sistemática da Ornitologia de Minas Gerais. Arq. Zool. Est. São Paulo, VIII: 1:52.
- SCHAUEHSEE, R.M. 1966 - The Species of Birds of South America and their distribution - Levingston Publ. Co. Harberth. Pennsylvania - 1.577 - Ilustr.
- _____. 1970 - A Guide to the birds of South America. Livingston Publ. Co., Harbearth. Wynnewood. Pennsylvania - 1:470. Ilustr.
- WALTERS, M. 1980. The Complete Birds of the World. David & Charles-Newton Abbot. London. North Promfret (Vt.).



Nº	LOCALIDADE	COORDENADAS	OBSERVAÇÃO
1	Serra do Caraça-MG	19°3' S 43°22' W	Carnevalli-1975*
2	Serra do Cipó-MG	19°5' S 43°18' W	Carnevalli-1976
3	Datas-MG	18°23' S 43°37' W	Carnevalli-1979
4	Diamantina-MG	18°13' S 43°36' W	Carnevalli-1979
5	Couto Magalhães-MG	18°3' S 43°23' W	Carnevalli-1979
6	Minas Novas-MG	17°13' S 42°5' W	Carnevalli-1979
7	Itacambira-MG	17°3' S 43°16' W	Carnevalli-1979
8	Berilo-MG	16°55' S 42°27' W	Carnevalli-1979
9	Coronel Murta-MG	16°31' S 42°11' W	Carnevalli-1979
10	Itaobim-MG	16°32' S 41°30' W	Carnevalli-1979
11	Divisópolis-MG	15°39' S 42°0' W	Carnevalli-1979
12	Morro do Chapéu-BA	11°80' S 41°0' W	Strikiland-1844

FIGURA 1 - Distribuição da *E. longicauda*

▲ Localidade tipo (Strikiland, 1844)

■ Primeira observação em MG (Carnevalli, 1975)

● Localidades registradas neste trabalho (obs. visual e cantos)

*Pele no Departamento de Zoologia - Divisão de Ornitologia ICB/UFMG. n. 3050.